

Manorapid[®] Synergy

polialkoholni antiseptik za ruke, osobito u području visokog rizika od kontaminacije virusima/ gotov za uporabu/ ready for use

iznimno snažan i potpuni VIRUCID*



SVOJSTVA I DJELOVANJE: specijalni virucidni polialkoholni antiseptik za primjenu u slučaju povišenog rizika od infekcija virusima u zdravstvenoj skrbi; baktericid (*M.tb*), fungicid i ekstremno snažan virucid – na listi RKI: inaktivira HBV (30s), HCV (30s), rino virus (30s), SARS-corona (30s), FCV (norwalk / noro /30s), adeno virus (60s), herpes simplex 1 i herpes simplex 2 (30s), polio tip 1(30-60 s), vaccinia (30s), virus influenza A i B (30 s), avian i swine influenza H5N1 i H1N1 (15s), polyoma virus SV40 (60s), respiratorni sincicijski virus RSV (60s), rota virus (15s), HIV (15s). Manorapid Synergy je prijavljen kao njemački patent (nr19612057) i registriran u USA i Kanadi; djelotvornost mu se zasniva na potpuno novom mehanizmu sinergističke aktivnosti čak 4 alkohola u nižim koncentracijama, koji manje opterećuju kožu, ali koji veoma dobro inaktiviraju neovijene kao i ovijene viruse i to u iznimno kratkom kontaktnom vremenu (15s do 1 min).

SASTAV: 100 ml otopine: 57,60 g etanola, 10 g 1-propanola, butandiol, propilenglikol

INDIKACIJE Higijenska i kirurška dezinfekcija ruku.

KONTRAINDIKACIJE: preosjetljivost na alkohole

NAČIN UPORABE: Rabi se nerazrijeđen. *Samo za vanjsku uporabu !*

Higijenska dezinfekcija ruku utrljavanjem - standard HRN EN 1500: najmanje 3 ml Manorapida Synergy se nanese na dlanove suhih ruku i zapešća i utrljava u kožu najmanje 30 s, sve dok se ruke potpuno ne osuše (vidi shemu Higijenska dezinfekcija ruku) .

Kirurška priprema ruku utrljavanjem: standard HRN EN 12971: nakon pranja ruku (šake, zapešća i podlaktice) blagim tekućim losionom za medicinsku primjenu (Dermotan, 2-3 ml, 30- 60 s)**, ispiranja i sušenja papirnatim ručnikom za jednokratnu uporabu ili sterilnom tkaninom, na osušenu kožu ruku i podlaktica i između prstiju nanosi se Manorapid Synergy postupno, u obrocima, tijekom najmanje 1.5 min i utrljava na sljedeći način:

- **najprije dezinficirajte sve: šake, zapešća, zatim podlaktice, uključujući i lakat** (0.5 min)
- **nakon toga utrljavajte ponovno u šake i zapešća** (0.5 min) i konačno
- **dezinficirajte ponovno samo šake, jednu pomoću druge** (0.5 min).

Na taj način će šake ostati ovlažene antiseptikom tijekom cijelog postupka, tj. 1.5 min, zapešća 1 min, a podlaktice 0.5 min. Nakon **1.5** min utrljajte i zadnju porciju antiseptika, sve dok se šake potpuno ne osuše. Nakon što se obavi postupak dezinfekcije, ruke više nemojte sušiti papirnatim ručnikom (vidi shemu Kirurška dezinfekcija ruku), nego ostavite da se uz aseptički pristup osuše na zraku. Prije navlačenja rukavica ruke ne smiju biti vlažne. Za utrljavanje koristite tehniku opisanu u standardu HRN EN 1500 u 6 koraka za higijensku dezinfekciju ruku

*Prema preporukama Robert Koch Instituta Bundesges.Blatt 01-2004.potpuni virucid mandatorno treba zadovoljiti kriterij djelotvornosti na neovijene viruse adeno, polio, zatim na HCV i vakciniju; time obučava i djelotvornost na sve druge neovijene i ovijene viruse, npr. HBV,HIV i dr..

** :Ruke se peru na početku radnog dana prije prve operacije i alkoholnog utrljavanja, zatim ako je razmak između operacije duži od 60 minuta, ili ako se rukavice perforiraju. Pranje koje je duže od 60 sekundi može oštetiti kožu. Tijekom postupka pranja može se koristiti četka, ali samo za čišćenje noktiju. četkanje može dovesti do iritacija i oslobađanja rezidentne flore

Manorapid Synergy primjenjuje samo stručno educirano zdravstveno osoblje. Kod učestale primjene preporučujemo korištenje losiona za njegu ruku.

MJESTO PRIMJENE: u područjima visokog rizika od infekcije virusima (operacijske dvorane, intenzivna njega, laboratoriji) te na bolničkim odjelima, uz krevet bolesnika, u ambulantama svih medicinskih praksi i disciplina, kućnoj njezi, prvoj pomoći, javnom zdravstvu.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati podalje od dohvata djece, te od plamena i izvora topline, na hladnom mjestu, pri temperaturi do 25 °C. Plamište prema DIN 517 55: 21,5 °C.

OPREMA: 30x150 ml, 20x500 ml, 2x5 L, eurodispenser za bocu od 500 ml.

REGISTRACIJA: Njemačka/ EU: proizvod je registriran kao lijek, Rješenje BGA 2004, njemačka: VAH Lista 2010./ RKI (certifikat Robert Koch Instituta – područje djelotvornosti A); Hrvatska: Broj i datum Rješenja Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u Očevidnik medicinskih proizvoda: Klasa UP/I-530-09708-05/267 od 19.rujna 2008.

PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH , D-50259 Pulheim. www.antiseptica.com
Proizvedeno sukladno standardima DIN EN ISO 9001/12.2001.2008 EN ISO 13485: 2003+AC:2007

Ekskluzivno zastupstvo, uvoznik i distributer: **ANTISEPTICA d.o.o.**, Magdalenićeva,1, Velika Gorica.,
tel. ++385 1 6214 790, fax 01 6226 952, e-mail: info@antiseptica.hr, www.antiseptica.hr



ANTISEPTICA